

TAC con contrasto

Preparazione

E' richiesto digiuno da cibi solidi e liquidi 5 ore prima dell'esame.

In caso di patologia diabetica in trattamento con il farmaco METFORMINA, sospendere l'assunzione 48 ore prima del giorno dell'esame. La terapia potrà essere ripresa trascorse 48 ore dalla esecuzione della prestazione.

Prendere regolarmente eventuali altri medicinali in uso (è consentito un uso moderato di acqua).

Esami preliminari

Eseguiti da non oltre un mese dalla data dell'esame

1) CREATININA

Allergie

Se il paziente soffre di fenomeni allergici, dovrà contattare l'anestesista dell'Istituto per valutare una eventuale preparazione antiallergica. Raramente a distanza di alcune ore dalla iniezione di mezzi di contrasto iodati, si possono verificare modeste reazioni della parete venosa; si consiglia in tal caso l'applicazione di impacchi caldo-umidi e in caso di persistenza interpellare il medico curante o un nostro medico.

Indicazioni per esecuzione su donne in età fertile

L'indagine può essere eseguita entro i primi 10 giorni dall'inizio del ciclo mestruale. Trascorsi 10 giorni, l'esame può essere effettuato SOLO se c'è stata astensione dai rapporti o se questi sono stati protetti. In caso di rapporti non protetti attendere il successivo ciclo mestruale prima di fissare l'appuntamento, oppure eseguire il test beta HCG e presentarsi in Istituto con i risultati (il test deve essere eseguito soltanto se sono passati almeno 15 giorni dal rapporto non protetto).

Richieste mediche

E' necessario presentare sempre la richiesta medica anche se specialistica, indipendentemente dal tipo di prestazione, in convenzione o privata.

Esami precedenti e terapie

Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio anche se eseguiti con metodiche diverse ed in altre strutture e segnalare terapie in atto.