

Clisma opaco semplice e doppio contrasto

Preparazione

IL GIORNO CHE PRECEDE L'ESAME:

- colazione normale
- pranzo: sono consentiti carne, formaggio, patate
- ore 16,30: 2 buste di PHOSPHO LAX in un bicchiere d'acqua
- nelle 3 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla)
- ore 20,00: 2 buste di PHOSPHO LAX in un bicchiere d'acqua
- nelle 2 ore successive bere 1 litro di liquidi (acqua, thè o camomilla)
- SALTARE CENA

IL GIORNO DELL'ESAME:

- colazione liquida (thè o camomilla)

Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso.

Allergie

Segnalare eventuali allergie a farmaci, polveri, mezzi di contrasto sia al momento dell'appuntamento, sia al Responsabile di Reparto.

Indicazioni per esecuzione su donne in età fertile

Gli esami RX possono essere eseguiti SOLO entro i primi 10 giorni dall' inizio del ciclo mestruale. Trascorsi 10 giorni, l'esame può essere effettuato SOLO se c'è stata astensione dai rapporti o se questi sono stati protetti. In caso di rapporti non protetti, attendere il successivo ciclo mestruale prima di fissare l'appuntamento oppure eseguire il test Beta HCG e presentarsi in Istituto con i risultati (il test deve essere eseguito soltanto se sono passati almeno 15 giorni dal rapporto non protetto).

Richieste mediche

E' necessario presentare sempre la richiesta medica anche se specialistica, indipendentemente dal tipo di prestazione, in convenzione o privata.

Esami precedenti e terapie

Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare terapie in atto.

Nota:

Attendere almeno 15 giorni da eventuale Rettoscopia o Rettocolonscopia con biopsia.